



Oplægning af optøede æg (embryoner) "Frysecyklus"

Nedfrosne befrugtede æg ("embryoner") kan optøs og oplægges i livmoderen. Ifølge lovgivningen må nedfrosne æg højst opbevares i fem år.

Hvis du har været gravid, skal du være færdig med at amme og dine menstruationer skal igen være regelmæssige. Ved tvivlstilfælde bør du have målt "mælkehormonet" (prolaktin).

Almindeligvis vil vi tilstræbe, at der er ét embryon til oplægning.

OBS: Ovitrelle® ("ægløsningssprøjten") skal opbevares i køleskab

Kvinder med regelmæssig menstruations-cyklus på højst 35 dage

Ring når menstruationen starter og aftal tid til ultralydsscanning på ca. 10.-12. cyklusdag.

Ved scanningen ses livmoderslimhindens tykkelse og månedens æg-blære måles.

Når skanningen viser, at ægblæren er klar til ægløsning aftales den videre plan.

- Ægløsningssprøjte: Ovitrelle® 250 mikrogram i pen (er det samme som 6500 IE). Tages om aftenen på den aftalte dag.
- Embryoner frosset som blastocyster tøs 5-6 dage efter ægløsningssprøjten. På denne dag ringer du til os på telefon 39405252 for at få at vide, hvordan blastocysten har klaret optøningen. På hverdage kan du ringe omkring klokken 11, i weekender og på helligdage omkring klokken 10.
- Vi har aftalt med dig, hvornår du skal komme til oplægning. Blastocyster tøs og oplægges samme dag. Du skal komme med *let fyldt* urinblære til oplægningen.
- På embryo-oplægningsdagen skal du om eftermiddagen hjemme tage 100 mikrogram hCG. Det gør du ved at tage "10 klik" fra en Ovitrelle® pen.
- På embryo-oplægningsdagen starter du også på at tage progesteron i skeden. Det kan være Cyclogest®, Lutinus® (3 gange daglig) eller Crinone® (2 gange daglig).
- Blodprøve for graviditet tages her i klinikken 17 dage efter ægløsningssprøjten.

Kvinder "uden" cyklus eller med lang menstruationscyklus (over cirka 35 dage)

Du starter på 2. eller 3. dagen med Østradiol eller Progynon® (se bagsiden)

- Efter ca. 10-12 dage bliver du ultralydskannet. Når slimhinden er tyk nok påbegyndes behandling med progesteron i skeden (Cyclogest®, Lutinus® eller Crinone®). Du skal fortsat også tage østradiol. De fleste får også progesteron (Cyclogest®) til at tage i endetarmen.
- Blastocyster tøs og oplægges 5-6 dage efter at du er startet på Cyclogest®/Lutinus®/Crinone®.
- Hvis du bliver *gravid*, skal du *fortsætte* behandlingen med østradiol og progesteron til du er i 10. uger gravid.
- Hvis graviditetsprøven er *negativ*, kan du slutte med østradiol og progesteron. Så får du menstruation få dage senere.

Frysecyklus med hormonbehandling

Oplægning af optøede embryoner i cyklus styret med østradiol og progesteron.
Anvendes til kvinder "uden" cyklus eller med lang menstruationscyklus (over cirka 35 dage).

